

老人のADLを低下させる 整形外科疾患

しばやま整形外科

柴山 慶

老人のADL低下

腰痛

歩行障害

外傷

脊椎圧迫骨折

大腿骨頸部骨折

加齢


変形性脊椎症

変形性関節症


腰部脊柱管狭窄症

脊椎压迫骨折

女性の骨量の変化





脊椎骨萎縮度の3次元CT画像



大腿骨頸部骨折








腰部脊柱管狭窄症



1 歩きはじめる



2 歩きだしてしばらくすると、
しびれや痛みが強くなり
歩きづらくなる






3 前かがみで少し休めば、
楽になり又歩けるようになる



1 2 3
を繰り返す。

変形性関節症



R





1. 0A#0. 6+0. 100DT6. 6



0A#0. 6+0. 100DT6. 6

モデルケース

A 骨折したものの、
寝たきり状態にならなかった場合

70歳 骨粗鬆症発症 腰痛
8年(96ヵ月) 外来治療 **480万円**

78歳 大腿骨頸部骨折 退院後、通院
3ヵ月入院治療 **140万円**
2年間外来治療 **120万円**

計 **740万円**

B 骨粗鬆症から骨折、
さらに寝たきり状態になった場合

70歳 骨粗鬆症発症 腰痛
8年(96ヵ月) 外来治療 **480万円**

78歳 大腿骨頸部骨折 退院後、寝たきり状態
3ヵ月入院治療 **140万円**
2年間特別養護老人ホーム入所 **650万円**

計 **1,270万円**

